

# Strojno učenje 6 Linearni modeli

Tomislav Šmuc


## Osnovni pojmovi

- Ulazni vektor varijabli (engl. *attributes, features*):  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ 
  - Broj ulaznih varijabli:  $d$
- Izlazna ili ciljna varijabla (engl. *target variable*):  $y$
- Primjer za učenje (engl. *training example*):  $(\mathbf{x}, y)$
- Skup primjera za učenje (engl. *training examples*):  $D = \{(\mathbf{x}_i, y_i); i =$

## Linearna regresija

- $f: X \rightarrow Y$  je linearna kombinacija ulaznih varijabli
- $f(\mathbf{x}) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_dx_d = w_0 + \sum_{j=1}^d w_jx_j$ 
  - $w_0, w_1, \dots, w_d$  – parametri modela (težine)
- Radi pojednostavljenja (vektorski zapis) možemo dodati još jednu (konstantu) varijablu ( $x_0=1$ )



$$f(\mathbf{x}) = w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_dx_d = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$$



## Funkcija greške

- Mjeri koliko predikcije odstupaju od željenih vrijednosti  $y$
- **Srednja kvadratna pogreška (MSE – Mean Squared Error):**

$$J = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(\mathbf{x}_i))^2$$



## Minimum funkcije greške => optimizacija

- $f: X \rightarrow Y$  je linearna kombinacija ulaznih varijabli

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i)^2$$

- Za optimum (optimalne težine  $\mathbf{w}$ ) vrijedi da je derivacija  $J(\mathbf{w}^*) = 0$

$$\frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial w_j} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - w_0 x_{i,0} - w_1 x_{i,1} - \dots - w_d x_{i,d}) x_{i,j} = 0$$

## Rješenje linearnog regresijskog problema

$$\frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}_j} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - w_0 x_{i,0} - w_1 x_{i,1} \dots - w_d x_{i,d}) x_{i,j} = 0$$

$$\nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}) = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i) \mathbf{x}_i = 0$$

Sistem linearnih jednačbi sa (d+1) nepoznanicom:

$$\mathbf{A}\mathbf{w}=\mathbf{b}$$

Sistem linearnih jednačbi – j-ta komponenta:

$$w_0 \sum_{i=1}^n x_{i,0} x_{i,j} + w_1 \sum_{i=1}^n x_{i,1} x_{i,j} + \dots + w_j \sum_{i=1}^n x_{i,j} x_{i,j} + w_d \sum_{i=1}^n x_{i,d} x_{i,j} = \sum_{i=1}^n y_i x_{i,j}$$

## Rješenje linearnog regresijskog problema

$$J(\mathbf{w}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w})$$

$$\nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}) = -2\mathbf{X}^T (\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}) = \mathbf{0}$$

Rješenje – inverzija matrica

$$\mathbf{w} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$$

$$\mathbf{w} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

Što ako je  $\mathbf{X}$  – singularna (determinanta =0, kolone matrice linearno ovisne)

Rješenje – izbaciti redundantne (linearno ovisne ) kolone

## Alternativno rješenje

Gradijentno spuštanje !

$$\mathbf{w}(t + 1) = \mathbf{w}(t) - \beta \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}(t))$$

## Standardno učenje

- Funkcija greške – sumacija preko grešaka na svim primjerima iz skupa za učenje

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i)^2$$

## Online učenje

- Umjesto ove sume - koristimo grešku za slučajno odabrani primjer  $\mathbf{x}_i$ :

$$J_{online} = \frac{1}{2} (y_i - f(\mathbf{x}_i))^2$$

$$\mathbf{w}(t + 1) = \mathbf{w}(t) - \beta(t+1) \nabla_{\mathbf{w}} J_{online}(\mathbf{w}(t))$$

$$\mathbf{w}(t + 1) = \mathbf{w}(t) - \beta(t+1)(y_i - f(\mathbf{x}_i))\mathbf{x}_i$$

$$\beta(t) > 0$$




## Proširenja jednostavnog linearnog modela

Umjesto direktnog korištenja ulaznih varijabli – bazne funkcije (basis functions) => nelinearni modeli:

$$f(\mathbf{x}) = w_0 + \sum_{j=1}^m w_j \varphi_j(\mathbf{x})$$

gdje su  $\varphi_j(\mathbf{x})$  – arbitrarne funkcije  $\mathbf{x}$

Primjeri baznih funkcija  $\varphi_j(\mathbf{x})$  :



$$\mathbf{x} = (x)$$

$$\varphi_1(x) = x; \varphi_2(x) = x^2; \varphi_3(x) = x^3$$

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2)$$

$$\varphi_1(\mathbf{x}) = x_1; \varphi_2(\mathbf{x}) = (x_1)^2; \varphi_3(\mathbf{x}) = x_2;$$

$$\varphi_4(\mathbf{x}) = (x_2)^2; \varphi_5(\mathbf{x}) = x_1 x_2$$

- Iste tehnike učenja mogu se koristiti za  $\mathbf{w}$ , kao i za obične linearne modele !

## Složenost linearnih modela

- Metoda najmanjih kvadrata – tipično velika varijanca modela (naročito osjetljiva na outlier primjere!)
- Generalizacija modela može se poboljšati tako da se neki parametri (težine) izjednače s nulom!
  - tako se povećava pristranost nauštrb varijance modela

## Rješenja

- Regularizacija
  - Ridge regression
  - Lasso algoritam
- Selekcija (najinformativnijih) varijabli (u jednom od slijedećih predavanja)
- Regresija sa glavnim komponentama (Principal Component Regression)

## Ridge regresija (ridge = greben)

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|^2$$

- Gdje je

$$\|\mathbf{w}\|^2 = \sum_{i=0}^d (w_i)^2$$

i    $\lambda \geq 0$

- $\|\mathbf{w}\|^2 = \sum_{i=0}^d (w_i)^2$  penalizira težine različite od nule sa  $\lambda$
- Isti efekt je kao da imamo običnu grešku najmanjih kvadrata uz ograničenje na ukupnu sumu kvadrata  $\mathbf{w}$ :

$$\sum_{i=0}^d (w_i)^2 \leq r$$

- Kada imamo nezavisne varijable koje su jako međusobno korelirane njihove težine  $w$  imaju veliku varijancu - RR uz ograničenje na ukupnu sumu kvadrata težina, rješava efektivno ovaj problem.
- $\lambda$  – regularizacijski koeficijent (en. „shrinkage coefficient”)

## Lasso regresija / algoritam

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|$$

- Gdje je


$$\|\mathbf{w}\| = \sum_{i=0}^d \|w_i\|$$

i  $\lambda \geq 0$

- Isti efekt je kao da imamo običnu grešku najmanjih kvadrata uz ograničenje na ukupnu sumu apsolutnih vrijednosti  $w$ :

$$\sum_{i=0}^d \|w_i\| \leq r$$

- Slično kao i kod ridge regresije – no efektivno Lasso sa smanjenjem  $\lambda$  inkrementalno radi selekciju varijabli (težine  $w$  manje važnih varijabli postaju nula ako se  $\lambda$  postepeno povećava)
- Kako izgledaju  $J(\mathbf{w})$  za ridge i lasso regresiju ? Kako se ponašaju koeficijenti za različite vrijednosti  $\lambda$  ?




$\mathbf{w}^*$  - Optimalne težine/parametri  $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$  bez ograničenja na  $\mathbf{w}$

$\mathbf{w}_L^*$  - Optimalne težine/parametri  $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$  uz Lasso ograničenje


$\mathbf{w}_R^*$  - Optimalne težine/parametri  $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$  uz Ridge ograničenje

Ponašanje težina varijabli  $\mathbf{w}$  za različite vrijednosti  $\lambda$  (odnosno ograničenje  $r$ )

Lasso  $\mathbf{w}$




Ridge  $\mathbf{w}$



# Linearni klasifikacijski modeli

- Što je linearna klasifikacija
  - Plohe između primjera različitih klasa su linearne (po dijelovima !)





- Što su Linearne metode klasifikacije?

Metode koje daju linearne granice između različitih klasa

$$\{x: \beta_0 + \beta_1^T x = 0\}$$

- Dva pristupa kako definirati granice između klasa

- Modeliranje diskriminantne funkcije  $\delta_k(x)$  za svaku od klasa kao linearne
  - Linearna regresija indikatorske matrice klasa
  - Logistička regresija (LOGREG)
  - Linearna diskriminantna analiza (LDA)
- Modeliranje granice između klasa kao linearne funkcije
  - Metoda potpornih vektora (Support Vector Machines)
  - Perceptron

## Modeliranje diskriminantne funkcije $\delta_k(x)$

- Model – diskriminantne funkcije  $\delta_k(x)$  - Različit za linearnu regresiju, LogReg i LDA
- Na granici između klasa  $j$  i  $k$   
 $\{x: \delta_j(x) = \delta_k(x)\}$
- Klasa je određena kao  $k$  za koju je funkcija  $\delta_k(x)$  najveća

$$C(x) = \arg \max_{k \in g} \delta_k(x)$$

## Linearna Regresija ciljne (klasne) - indikatorske varijable

- Imamo  $K$  ciljnih varijabli (indikatorske)  
 $K$  = broj klasa
- Linearni model za  $k$ -tu indikatorsku varijable  $\longrightarrow f_k(\mathbf{x}) = w_{k0} + \mathbf{w}_k^T \mathbf{x}$
- Linearna diskriminantna funkcija za klasu  $k$ :  $\longrightarrow \delta_k(\mathbf{x}) = f_k(\mathbf{x})$
- Granica između klasa je skup točaka za koje je:  
 $\longrightarrow \{\mathbf{x} : f_k(\mathbf{x}) = f_l(\mathbf{x})\} = \{\mathbf{x} : (w_{k0} - w_{l0}) + (\mathbf{w}_k - \mathbf{w}_l)^T \mathbf{x} = 0\}$
- Klasifikacija novog primjera – u klasu sa najvećom  $\delta_k(\mathbf{x})$   
 $\longrightarrow C(\mathbf{x}) = \arg \max_{k \in C} \delta_k(\mathbf{x})$

## Linearna Regresija ciljne (klasne) - indikatorske varijable

- Ako naš klasifikacijski problem  $C$  ima  $K$  klasa – imamo  $K$  klasnih indikatorski varijabli  $y_k$ ,  $k=1, K$ :

C	$y_1$	$y_2$	$y_3$	...	$y_K$
1	1	0	0	..	0
3	0	0	1	..	0
4	0	0	0	..	0
K	0	0	0	..	1
2	0	1	0	..	0

- Odredimo regresijski model za svaku  $y_k$ :

$$\hat{\mathbf{y}}_k(\mathbf{x}) = \mathbf{X}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}_k$$

## Linearna Regresija ciljne (klasne) - indikatorske varijable

### Klasifikacijska procedura

- Definiramo matricu  $\mathbf{W}$ :

$$\longrightarrow \mathbf{W} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$$

- Za neki novi primjer  $\mathbf{x}$ , izračunamo:

$$\longrightarrow \mathbf{f}(\mathbf{x}) = [(1, \mathbf{x}) \mathbf{W}]^T = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \\ \dots \\ \dots \\ f_K(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

- Na kraju – klasa  $\mathbf{x}$  određuje se prema najvećoj komponenti  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ :

$$\longrightarrow C(\mathbf{x}) = \arg \max_{k \in C} f_k(\mathbf{x})$$

- Pojašnjenje


- Linearna Regresija indikatorske varijable (klase)  $Y_k$  linearna je aproksimacija očekivanja  $E(Y_k/X)$

$$f_k(\mathbf{x}) = E(Y_k | X = \mathbf{x}) = P(C = k | X = \mathbf{x})$$

- Odnosno aposteriorne vjerojatnosti indeksa klase ciljne varijable

$$\begin{aligned} E(Y_k | X = \mathbf{x}) &= P(Y_k = 1 | X = \mathbf{x}) \cdot 1 + P(Y_k = 0 | X = \mathbf{x}) \cdot 0 \\ &= P(Y_k = 1 | X = \mathbf{x}) \\ &= P(C = k | X = \mathbf{x}) \end{aligned}$$

- Problemi s linearnom regresijom – „maskiranje” klasa




- $\hat{y}_2$  – nikada ne dominira nad  $\hat{y}_1$  i  $\hat{y}_3$
- Svi primjeri klase  $C=2$  se klasificiraju kao 1 ili 3 !?
- „maskiranje” klasa - za velike  $K$  ( $>3$ )

## Logistička regresija

- Definira linearne granice između klasa – diskriminativni algoritam
- Diskriminativne funkcije

$$g_1(\mathbf{x}) = g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}); g_0(\mathbf{x}) = 1 - g(\mathbf{w}^T \mathbf{x});$$

- Gdje je  $g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}) = \frac{1}{1+e^{-\mathbf{w}^T \mathbf{x}}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{w})$  - logistička funkcija  
(sigmoidalna funkcija)




- Vrijednosti logističke funkcije  $\in [0,1]$  !



## Logistička regresija

Probabilistička interpretacija !



$$p(y = 1|x, \mathbf{w}) = f(x, \mathbf{w}) = g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}) = \frac{1}{1+e^{-\mathbf{w}^T \mathbf{x}}}$$
$$p(y = 0|x, \mathbf{w}) = 1 - p(y = 1|x, \mathbf{w})$$

**Klasifikacija:**


Ako  $p(y = 1|x, \mathbf{w}) \geq 0.5$  tada  $y=1$   
Inače  $y = 0$

## Logistička regresija

- Definira linearnu diskriminativnu plohu između klasa
- Zašto?
  - Na plohi vrijedi da su diskriminativne funkcije jednake:  $g_1(\mathbf{x}) = g_0(\mathbf{x})$ , dakle:

$$\log\left(\frac{g_0(\mathbf{x})}{g_1(\mathbf{x})}\right) = \log\left(\frac{1 - g(\mathbf{w}^T \mathbf{x})}{g(\mathbf{w}^T \mathbf{x})}\right) = 0$$

$$\log\left(\frac{g_0(\mathbf{x})}{g_1(\mathbf{x})}\right) = \log\frac{\frac{\exp^{-\mathbf{w}^T \mathbf{x}}}{1 + \exp^{-\mathbf{w}^T \mathbf{x}}}}{\frac{1}{1 + \exp^{-\mathbf{w}^T \mathbf{x}}}} = \log(\exp^{-\mathbf{w}^T \mathbf{x}}) = -\mathbf{w}^T \mathbf{x} = 0 \quad !!$$



## Logistička regresija

### Učenje parametara $\mathbf{w}$

- Vjerojatnost podataka  $L(D, \mathbf{w})$  uz  $\mathbf{w}$ 
  - $D_i = \langle \mathbf{x}_i, y_i \rangle$ ;  $\mu_i = p(y_i = \mathbf{1} | \mathbf{x}_i, \mathbf{w}) = g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i)$
  - $L(D, \mathbf{w}) = \prod_{i=1}^n P(y = y_i | \mathbf{x}_i, \mathbf{w}) = \prod_{i=1}^n \mu_i^{y_i} (1 - \mu_i)^{(1-y_i)}$
- Odrediti težine  $\mathbf{w}$  koje maksimiziraju izglednost (likelihood) podataka
- Trik: Logaritam izglednosti (Max Log-Likelihood)
  - Optimalne težine jednake su i za  $L(D, \mathbf{w})$  i za  $\log(L(D, \mathbf{w}))$  !

$$\begin{aligned} \log(L(D, \mathbf{w})) &= \log \prod_{i=1}^n \mu_i^{y_i} (1 - \mu_i)^{(1-y_i)} = \sum_{i=1}^n \log \mu_i^{y_i} (1 - \mu_i)^{(1-y_i)} = \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i \log \mu_i + (1 - y_i) \log(1 - \mu_i)) \end{aligned}$$

## Logistička regresija - Učenje parametara $\mathbf{w}$

- Log-likelihood

$$\log(L(D, \mathbf{w})) = \sum_{i=1}^n (y_i \log \mu_i + (1 - y_i) \log(1 - \mu_i))$$

- Derivacija  $\log(L(D, \mathbf{w})) \Rightarrow$  negativni gradijent

$$-\frac{\partial}{\partial w_j} \log(L(D, \mathbf{w})) = \sum_{i=1}^n -x_{i,j} (y_i - g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i))$$

$$\nabla_{\mathbf{w}}[-\log(L(D, \mathbf{w}))] = \sum_{i=1}^n -\mathbf{x}_i (y_i - g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i))$$

- Gradijentno spužtanje

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)} - \beta(k) \nabla_{\mathbf{w}}[-\log(L(D, \mathbf{w}))]_{\mathbf{w}^{(k-1)}}$$

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)} - \beta(k) \sum_{i=1}^n -\mathbf{x}_i (y_i - g(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i))$$

- Parametri LogReg se također mogu učiti korištenjem online metode !

## Logistička regresija - Algoritam za online učenje parametara $w$

**Online LogReg** ( $D$ , broj\_iteracija)

**Inicijaliziraj težine**  $w^{(0)} = (w_0, w_1, w_2, \dots, w_d)$

**For**  $i=1:\text{broj\_iteracija}$

**do**

**izaberi primjer** iz  $D = \langle \mathbf{x}_k, y_k \rangle$

**postavi**  $\beta_i = 1/i$

**odredi nove težine**


$w = w + \beta_i [y_i - g(w^T \mathbf{x})] \mathbf{x}_i$

**end for**


**Vrati** težine  $w$

## Usporedba Linearna regresija i Logistička regresija

$$f(x) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$$



$$f(x) = p(y = 1 | x, \mathbf{w}) = g(\mathbf{w}^T \mathbf{x})$$



$$\mathbf{w} = \mathbf{w} + \beta \sum_{i=1}^n (y - f(x)) \mathbf{x}$$

Učenje modela ima isti oblik !

## Nelinearna ekstenzija LogReg i Linearne regresije

Korišćenje nelinearnih baznih funkcija

### Linearna regresija

$$f(\mathbf{x}) = w_0 + \sum_{j=1}^m w_j \varphi_j(\mathbf{x})$$

### Logistička regresija

$$f(\mathbf{x}) = g\left(w_0 + \sum_{j=1}^m w_j \varphi_j(\mathbf{x})\right)$$

$\varphi_j(\mathbf{x})$  - arbitrarne funkcije  $\mathbf{x}$

## LDA

### Pretpostavke:

- (više-dimenzionalna) Gaussova distribuciju kao model gustoće uvjetne vjerojatnosti po klasama
- Ista kovarijacija po varijablama za sve klase

Klasifikacija se bazira na određivanju aposteriorne vjerojatnosti za klasu:

$$P(C = k | \mathbf{x}) = \frac{f_k(\mathbf{x})\pi_k}{\sum_{l=1}^K f_l(\mathbf{x})\pi_l} \quad \longleftarrow \quad \text{Bayesovo pravilo}$$

$\pi_k$  – apriorna vjerojatnost pojave klase  $k$

Klasa se modelira preko  $f_k(\mathbf{x})$  – gustoća uvjetne vjerojatnosti ( $p(\mathbf{x} | C=k)$ )

$$f(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x} | c_k) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\boldsymbol{\Sigma}_k|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_k)^T \boldsymbol{\Sigma}_k^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_k)}$$

$\boldsymbol{\Sigma}_k = \boldsymbol{\Sigma}$  - kovarijacijska matrica  
! ista za sve klase (za LDA) !



## Parametri:

Na bazi skupa primjera za učenje:

apriorne vjerojatnosti:  $\Rightarrow \hat{\pi}_k = N_k / N$

srednje vrijednosti:  $\Rightarrow \hat{\mu}_k = \sum_{g_i=k} x_i / N_k$

kovarijacijska matrica:  $\Rightarrow \hat{\Sigma}_k = \sum_i r_i^k (x_i - \hat{\mu}_k) * (x_i - \hat{\mu}_k)^T$   
 $r_i^k = 1, \text{ ako } x_i \in C_k, \text{ inače } r_i^k = 0$

(Parametri su određeni po principu ML (max likelihood) – uz prethodne pretpostavke).

uz korištenje log-odds...

$$\begin{aligned} \log \frac{P(C = k | X = \mathbf{x})}{P(C = l | X = \mathbf{x})} &= \log \frac{\pi_k}{\pi_l} + \log \frac{f_k(\mathbf{x})}{f_l(\mathbf{x})} \\ &= \underbrace{\left( \log \pi_k + \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_k - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_k^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_k \right)}_{\delta_k(\mathbf{x})} - \underbrace{\left( \log \pi_l + \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_l - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_l^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_l \right)}_{\delta_l(\mathbf{x})} \end{aligned}$$

Diskriminativne funkcije  
za klasu  $k$  i  $l$ :

Klasifikacija:  $C(\mathbf{x}) = \arg \max_k \delta_k(\mathbf{x}) \quad \equiv \arg \max_k P(C = k | \mathbf{x})$

Granica između klasa je definirana gdje vrijedi ( $\delta_k(\mathbf{x}) = \delta_l(\mathbf{x})$ ):


$$\log \pi_k + \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_k - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_k^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_k = \log \pi_l + \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_l - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_l^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_l$$

## Kvadratna diskriminativna analiza - QDA

- Relaksira pretpostavku-uvjet iste kovarijacijske matrice – gustoće vjerojatnosti za klase (multivarijantne Gaussove distribucije) mogu imati različite kovarijacijske matrice
- Posljedica – granice između klasa nisu linearne, nego kvadratne !


$$\log \pi_k + \mathbf{x}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_k - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_k^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_k$$

$\delta_k(x)$  – **LDA**




$$\log \pi_k - \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k)^T \boldsymbol{\Sigma}_k^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_k) - \frac{1}{2} \log |\boldsymbol{\Sigma}_k|$$

$\delta_k(x)$  – **QDA**



## LDA vs QDA - Granice između klasa



LDA

QDA

## **Linearne metode**

The Elements of Statistical Learning

Hastie, Tibshirani, Friedman (chapter 4)